

ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία από τις συμφύσεις.

Να έχει εξαιρετική ανοχή ώστε να δύναται η χορήγηση ενός 1γρ. ανά 1 kg σωματικού βάρους, ώστε να μην είναι τοξική. Να υπάρχουν κλινικά δεδομένα και πιστοποίηση CE για την ταυτόχρονη προστασία αιμόστασης και για την αποτελεσματικότητα για την προφύλαξη από συμφύσεις τόσο ως σκόνη με μετέπειτα διαβροχή με ισότονο φ.ο. όσο και σε μορφή εξωσωματικής προανεμειγμένης γέλης σε δοιαφορετικά ιξώδη, ώστε να μειώνεται ο σχηματισμός συμφύσεων περίπου 93% (να αποδεικνύεται με κλινική μελέτη). Να διασπάται από την αμυλάση και γλυκοαμυλάση. Να είναι λεπτή, ξηρή σκόνη, αποστειρωμένη, απυρετογόνος, βιοσυμβατή. Να μην περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά.

Σε διαστάση των 3 γρ. 5 γρ. και 9 γρ η δόση για ταυτόχρονη χρήση αντισυμφητικού gel να διαμορφώνεται στα 20-40ml ισot. Φ.Ο.

*Να συνοδεύεται από εξειδικευμένο σωλινίσκο μήκους 38cm σε ξεχωριστή αποστειρωμένη σακούλα, για λαπαροσκοπική ή ενδοσκοπική χρήση κατάλληλο. Να αποτελείται από τρία στοιχεία: (1) την εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή με οπή σύνδεσης με το απλικατέρ τύπου φυσούνας (2) τον εύκαμπτο εσωτερικό σωλήνα για την εφαρμογή του κατάλληλου αιμοστατικού μήκος 38 εκατοστά και (3) το σταθερό εξωτερικό σωλήνα που έχει μήκος 33 εκατοστά.