

α. Ενδοφακός μιας χρήσης, ακρυλικός 100%, υδρόφοβος αναδιπλούμενος, οπίσθιου θαλάμου, ενός τεμαχίου (one-piece), με φίλτρο κίτρινου πολυμερισμένου chomophore κατά της μπλε ακτινοβολίας και ασφαιρική οπίσθια επιφάνεια, με μειωμένο κατά 9% πάχος φακού για ένθεση από τομή 2,2 mm, με περιεκτικότητα σε νερό< 1%, με δείκτη διάθλασης 1.55, με ολική διάμετρο 13 mm, με διάμετρο οπτικής ζώνης 6 mm και ασφαιρικό τύπο οπτικής ζώνης, με ποδαράκια (haptics) ακρυλικά τύπου modified-L και γωνίαση 0 μοιρών, με σταθερά A-Constant: 118,7, με εύρος διοπτριών 6-30 D (ανά 0,50D) και να είναι προφορτωμένος σε ενθετήρα μιας χρήσης με ειδικό ρύγχος εισόδου προφυλακτικού stop.

-Επιθυμητή ποσότητα: εκατό (100) ενδοφακοί.

β. Μονοεστιακός ενδοφακός ενός τεμαχίου, προφορτωμένος σε αυτόματο σύστημα μεταφοράς και ένθεσης συμπιεσμένου αερίου. Ο ενδοφακός να είναι ασφαιρικός, υδρόφοβος από ακρυλικό/μεθακρυλικό συμπολυμερές με φίλτρο για την υπεριώδη ακτινοβολία και την μπλε ακτινοβολία. Με τεχνολογία κοπής, η οποία να μειώνει τα προσοστά P.C.D. και τα φωτοπικά φαινόμενα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα να είναι εργονομικό, να επιτρέπει την μεταφορά και ένθεση του ενδοφακού με ένα χέρι και με ελεγχόμενη ταχύτητα της προώθησης του ενδοφακού κατά την ένθεση. Το ακροφύσιο να είναι ελεγχόμενου βάθους για τομές μέχρι και 2,2 mm. Με δείκτη διάθλασης άνω του 1.55, διάμετρο οπτικής ζώνης 6mm και συνολικό μήκος 13mm. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

- Επιθυμητή ποσότητα: εκατόν πενήντα (50) ενδοφακοί

γ. Συνδυασμός υαλουρονικού νατρίου 1.5% με υδροχλωρική λιδοκαίνη 1% για intracameral αναισθησία. Στη συσκευασία περιέχονται δύο αποστειρωμένες αμπούλες υδροχλωρικής λιδοκαίνης 2% σε συνδυασμό με υαλουρονικό νάτριο 0,3% για τοπική αναισθησία.
-Επιθυμητή ποσότητα : Πενήντα (50) τεμάχια.