

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
3	Αντισυμφυτική γέλη των 40 ml κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις εντός του περιτοναίου, σύνθεσης από πολυαιθυλενοξείδιο και νατριούχα καρβοξυμεθυλοκυαταρίνη προφορτωμένη και έτοιμη για χρήση διαθέτοντας μεταλλικό εφαρμογέα 30cm. Να παραμείνει στο χειρουργικό πεδίο 28 ημέρες. Η συσκευασία να περιέχει δύο σύριγγες των 20 ml γέλης η κάθε μία.	1
4	Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου εώς και 7mm. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με μηχανισμό κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική πήξη αιμορραγιών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών (Dissection). Να είναι μήκους 22,5 mm, κοπής περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης των αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού. Να είναι μιας χρήσης μήκους 37 cm και διαμέτρου 5mm.	1